

## برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک: ۲.۵ mg/m <sup>۳</sup>		شماره ثبت اثرات سمی: SM ۶۳۰۰۰۰۰		شماره اختصاصی: ۸۷-۸۶-۵		فرمول: C <sub>۵</sub> Cl <sub>۵</sub> OH		پنتاکلروفنل		Pentachlorophenol	
کد حمل و نقل: ۱۵۴ ۳۱۵۵		تبدیل:									
نامهای تجاری / مشابه: PCP، پنتا، ۲و۳و۴و۵و۶ - پنتا کلروفنل											
روشهای اندازه گیری Niosh: ۵۵۱۲ روشهای اندازه گیری Osha:				حدود تماس شغلی Niosh: [از راه پوست] ۰.۵ mg/m <sup>۳</sup> TWA حدود تماس پیشنهادی Osha: [از راه پوست] ۰.۵ mg/m <sup>۳</sup> TWA							
				خواص فیزیکی: جامد کریستالی بی‌رنگ تا سفید با بوی شبیه بنزین [قارچ کش]							
رسپراتور پیشنهادی Niosh: ۲.۵mg/m <sup>۳</sup> : رسپراتور نیم صورت تصفیه کننده هوا مجهز به کارتریج ضد بخارات آلی با فیلتر P۹۵، R۹۵، N۹۵ - شرایط دارای اثرات حاد: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت. - شرایط فرار: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت چانه دار با کارتریج ضد گاز و بخارات آلی مجهز به فیلتر P۱۰۰، R۱۰۰، N۱۰۰				حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی پوست: برای جلوگیری از تماس پوستی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید. چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی از محافظ چشم مناسب استفاده کنید. شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد. بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرطوب شده یا بطور مشخص آلوده شده بود باید در آورده و تعویض شود. تعویض لباس: کارگرانی که لباسشان ممکن است آلوده شده باشد باید قبل از ترک محل کار لباسشان را با یک لباس غیر آلوده تعویض کنند. تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش و چشم شوی تهیه شود.							
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کننده‌های قوی- اسیدها - قلیاها											
کمک های اولیه چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید. پوست: فوراً لباس آلوده را درآورده و پوست را با آب و صابون بشوئید. به پزشک مراجعه کنید. تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند به محض امکان به پزشک مراجعه شود. بلعیدن: اگر این ماده بلعیده شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.				راههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم راههای ورود: استنشاق- جذب پوستی- گوارش- تماس چشمی نشانه بیماری: تحریک چشم، بینی و گلو- عطسه- سرفه - ضعف- بی اشتها - کاهش وزن- تعریق - سردرد- گیجی- تهوع - استفراغ- تنگی تنفس- درد سینه- تب بالا- التهاب پوستی اعضای مورد هجوم: چشم - پوست- سیستم تنفسی- سیستم قلبی عروقی- کبد- کلیه- سیستم اعصاب مرکزی							